

## HEMOAL 50 G



Calificación: Sin calificación

**Precio**

12,62 €

12,62 €

0,49 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [RECKITT BENCK HC](#)

Descripción

### ACCIÓN Y MECANISMO

Asociación de anestésico local (benzocaína) con simpaticomimético (efedrina) con acción vasoconstrictora.

### INDICACIONES

[HEMORROIDES]

Tratamiento sintomático del dolor, picor o escozor asociado a hemorroides.

### POSOLOGÍA

- Adultos, tópico rectal: Generalmente, 3-4 aplicaciones al día (mañana, noche y después de cada defecación). Si los síntomas anorrectales (dolor, picor y escozor) no mejoran en 7 días o apareciese hemorragia, se deberá reevaluar la situación clínica.
- Ancianos: Reducir la dosis en los mayores de 65 años y pacientes debilitados, debido a un mayor riesgo de toxicidad sistémica.

### NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Aplicación tópica rectal. Limpiar cuidadosamente el área afectada con un jabón suave, secarla sin frotar y aplicar la pomada mediante una gasa limpia.

Para la aplicación intrarrectal, enroscar la cánula al tubo. Antes de introducirla, lubricar el esfínter anal con la misma pomada para facilitar la penetración.

**CONTRAINDICACIONES**

[ALERGIA A ANESTESICOS LOCALES TIPO ESTER].

**PRECAUCIONES**

Pacientes con problemas cardíacos, [HIPERTENSION ARTERIAL], alteraciones tiroideas, [DIABETES], con [HIPERPLASIA PROSTATICA] o en tratamiento con antidepresivos.

Mantener una función intestinal normal mediante una dieta apropiada (frutas, verduras, una ingestión de líquidos adecuada y un ejercicio regular. Puede ser útil tomar simultáneamente algún laxante, aumentador del volumen o ablandador de las heces. Evitar un uso excesivo de laxantes, ya que podría producir pereza intestinal.

En los mayores de 65 años y pacientes debilitados, debido a una mayor tendencia a la toxicidad sistémica se deberá reducir la dosis.

No está recomendado para uso en niños debido a la escasez de datos sobre eficacia y seguridad

**REACCIONES ADVERSAS**

- Trastornos del sistema nervioso (muy raramente): Reacciones de hipersensibilidad o manifestaciones sistémicas ([NERVIOSISMO], [ANSIEDAD], [CEFALEA], [INSOMNIO]) sobre todo en individuos predispuestos.

- Trastornos cardíacos (muy raramente): [PALPITACIONES]. Raramente: La administración tópica durante períodos prolongados de tiempo puede producir [CARDIOPATIA ISQUEMICA] debido a la acción vasoconstrictora de la efedrina

- Otras: Raramente: Reacción anafilactoide (consistente en [DERMATITIS POR CONTACTO]), sensación de quemazón anal y muy excepcionalmente metaglobinemia caracterizada por cianosis.

El contacto prolongado de la benzocaína con las membranas mucosas puede producir deshidratación del epitelio y endurecimiento de las mucosas.

En caso de observarse la aparición de reacciones adversas, debe suspenderse el tratamiento y notificarse a los sistemas de Farmacovigilancia

**DOPAJE**

Este medicamento puede dar positivo en un control antidopaje. Su utilización se considera prohibida en competición.

[Prospecto en PDF](#)

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.