

LACTEOL 10 CAPS



Calificación: Sin calificación

Precio

10,90 €

10,90 €

0,42 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [RAMÓN SALA](#)

Descripción

COMPOSICIÓN

Lactobacillus acidophilus (muertos), 10.000 millones de bacterias (como 340 mg de polvo liofilizado de cuerpos bacterianos de Lactobacillus acidophilus cepa Lacteol (LB), muertos en su medio de cultivo, fermentado y neutralizado).

ACCIÓN Y MECANISMO

[ANTIDIARREICO]. Antidiarreico de origen microbiano, que actúa por estimulación del crecimiento de la flora acidógena intestinal.

INDICACIONES

- [DIARREA]: Tratamiento sintomático de las diarreas inespecíficas.
- Prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos causados por la destrucción de la flora intestinal debido a la administración de antibióticos.

POSOLOGÍA

- Adultos y niños: La dosis usual es de 1 a 2 cápsulas/sobre al día. En caso de tomarse dos, se repartirán en dos tomas.
- En diarrea aguda: puede aumentarse la dosis a 3 cápsulas/sobres el primer día de tratamiento, repartidos en tres tomas, para seguir con la dosis usual durante los días siguientes.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Las cápsulas se tragan con ayuda de un líquido. El contenido del sobre se toma dispersado en medio vaso de agua. En niños, el polvo puede mezclarse con algún alimento

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a cualquier componente de este medicamento.
- [INTOLERANCIA A LACTOSA] o a la leche.

ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES:

- Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con [INTOLERANCIA A LACTOSA] hereditaria o galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malaabsorción de glucosa o galactosa, no deben tomar este medicamento.

CONSEJOS AL PACIENTE

- Dado el riesgo de deshidratación que comporta una diarrea, especialmente en niños y en ancianos, este tratamiento se complementará con la ingestión de abundante líquidos o de rehidratación cuando se crea necesario.
- Se recomienda establecer una dieta astringente.

INTERACCIONES

La administración concomitante de antibióticos puede disminuir el efecto de este preparado.

REACCIONES ADVERSAS

Aunque no se han observado reacciones adversas con este medicamento, en algunos casos se han descrito las siguientes reacciones adversas respecto a los Lactobacillus: [ERUPCIONES EXANTEMATICAS], [AEROFAGIA], [FLATULENCIA], eructos, [HIPO] y [ESTREÑIMIENTO].

[Prospecto en PDF](#)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.