

PEROXIBEN PLUS 5% GEL 30 G



Calificación: Sin calificación

Precio

10,82 €

10,82 €

0,42 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ISDIN](#)

Descripción

ACCIÓN Y MECANISMO

- [ANTIACNEICO]. [ANTIBACTERIANO DE USO TOPICO] activo frente a Propionibacterium acnes, microorganismo implicado en el acné vulgar. También es [QUERATOLITICO] y [ANTISEBORREICO], contrarrestando la hiperqueratinización y el exceso de secreción de sebo asociada al acné.

FARMACOCINÉTICA

La penetración percutánea de peróxido de benzoilo es baja; cuando se aplica en la piel, es completamente convertido a ácido benzoico el cual es rápidamente eliminado en orina.

INDICACIONES

- [ACNE VULGAR] de grado moderado.

POSOLOGÍA

Adultos, vía tópica: Tratamiento inicial: 1-2 aplicaciones al día sobre el área afectada recién lavada y seca. En pacientes con piel muy sensible, se aconseja iniciar el tratamiento con una aplicación al día.

Se recomienda comenzar con las presentaciones de menor concentración a ir aumentándola gradualmente.

Puede observarse mejoría a los 4-6 semanas, aunque pueden ser necesarios periodos más prolongados.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Aplicar sobre piel recién lavada y seca una fina película de gel con la yema de los dedos, evitando los ojos, boca, orificios nasales o membranas mucosas. Si entrara en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua templada.

No debe aplicarse sobre piel dañada o eczematosa, ni sobre cortes o abrasiones.

Puede producir decoloración, por lo que no debe entrar en contacto con ningún material teñido (pelo, tejidos).

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad al peróxido de benzoilo.

PRECAUCIONES

- [HERIDAS]. No debe aplicarse sobre piel dañada o eczematosa, ni sobre cortes o abrasiones por el posible riesgo de absorción. Evitar los ojos, boca, orificios nasales o membranas mucosas. Si entrara en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua templada.

- [REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD]. Si se produce una reacción que sugiera sensibilidad a cualquiera de los componentes, interrumpir la aplicación.

- Uso de cosméticos. Tener precaución si se utilizan cosméticos con efectos descamativos, irritantes o reseccantes, ya que éstos pueden potenciar efectos irritativos del peróxido de benzoilo.

- [REACCIONES DE FOTSENSIBILIDAD]. El peróxido de benzoilo podría producir fotosensibilidad. Evitar la exposición excesiva a la luz solar o radiación UV. Sería aconsejable usar filtros solares o ropa protectora.

- Evitar el contacto con los ojos, membranas mucosas, piel inflamada o erosionada y cabello.

- Puede blanquear el pelo y los tejidos teñidos o de color.

CONSEJOS AL PACIENTE

- Se debe evitar aplicar sobre piel dañada, ojos y boca.

- Evitar que entre en contacto con pelo o tejidos teñidos, porque puede decolorarlos.

- Evitar la exposición excesiva al sol o radiación UV.

- Avisar al médico y/o farmacéutico en caso de observarse síntomas de reacción alérgica.

- Tener precaución si se utilizan cosméticos descamativos, irritantes o reseccantes por riesgo de que potencien el efecto irritativo del peróxido de benzoilo.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

- Si se produce una reacción que sugiera sensibilidad a cualquiera de los componentes, interrumpir la aplicación.

INTERACCIONES

No se han descrito interacciones y debido a su baja absorción, no son de esperar. No obstante, sería aconsejable evitar la administración conjunta con ácido azelaico y cosméticos descamativos, irritantes o reseccantes.

EMBARAZO

Categoría C de la FDA. Se desconoce si puede causar daño fetal cuando se administra a embarazadas o si afecta a la capacidad reproductiva. Sin embargo, la administración tópica se suele considerar segura para su uso durante el embarazo. Uso en embarazadas sólo si es estrictamente necesario.

LACTANCIA

Se desconoce si este fármaco se excreta en leche materna y los posibles efectos en el lactante. Uso precautorio.

NIÑOS

La seguridad y eficacia del uso de este fármaco en niños menores de 12 años no han sido establecidas. Uso no recomendado en menores de 12 años.

ANCIANOS

No se dispone de información específicamente geriátrica.

REACCIONES ADVERSAS

En el lugar de aplicación pueden aparecer:

- [HERIDAS]. [SEQUEDAZ DE PIEL], [DESCAMACION CUTANEA], [ERITEMA] y ocasionalmente [EDEMA].

- [REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD]: [DERMATITIS POR CONTACTO] (ardor, escozor y enrojecimiento). En caso de [IRRITACION CUTANEA] excesiva, eliminar el producto con agua y jabón, no debiendo ser aplicado hasta el día siguiente.

[Prospecto en PDF](#)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.