

## TANTUM VERDE 510 MCG AEROSOL BUCAL 15 ML



Calificación: Sin calificación

**Precio**

9,45 €

9,45 €

0,36 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ANGELINI](#)

Descripción

### ACCIÓN Y MECANISMO

Analgésico, antiinflamatorio. Derivado benzoimidazólico. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas.

### INDICACIONES

- [FARINGITIS], [ESTOMATITIS]: Tratamiento sintomático para el alivio del dolor e irritación de la boca y garganta ([DOLOR DE GARGANTA]).

Colutorio: Alivio local sintomático del dolor e irritación de la garganta, boca y encías que cursen sin fiebre.

Pulverizador bucal: Alivio local sintomático de las irritaciones de la garganta y de la boca que cursen con dolor y sin fiebre.

### POSOLOGÍA

- Adultos y niños mayores de 12 años, tópica:

\* Pastillas oral, local: Una pastilla para chupar 3 veces al día. El tratamiento no debe exceder los 7 días.

\* Colutorio: enjuague local o gargarismo con 15 ml (1 cucharada)/6-12 h.

\* Aerosol bucal: 1-3 pulverizaciones diarias, durante 4-6 días. El tratamiento no debe exceder de los 6 días.

- Niños de 6 a 11 años:

\* Pastillas: la administración del producto debe realizarse bajo la supervisión de un adulto.

\* Colutorio: No se aconseja usarlo en niños menores de 12 años, salvo mejor criterio médico.

\* Aerosol bucal: No se aconseja usarlo en niños menores de 12 años, salvo mejor criterio médico.

**NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN**

- Colutorio: Utilizar, después de cepillarse los dientes, sin diluir o diluido en agua a partes iguales. Aplicar, durante 30 seg, mediante enjuagues en caso de afecciones bucales o mediante gargarismos en caso de afecciones de la garganta.
  - Aerosol bucal: Agitar el aerosol vigorosamente durante varios segundos. A continuación levantar la cánula y apretar varias veces el pulsador hasta obtener una pulverización regular. Introducir entonces la cánula en la zona de dolorida y apretar el pulsador.
- No sobrepasar la dosis indicada. No comer ni beber hasta después de 1 h de utilizar el medicamento.

**ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES:**

- Por contener parahidroxibenzoato de metilo puede provocar reacciones alérgicas (posiblemente retardadas).

**CONSEJOS AL PACIENTE:**

- No utilizar durante más de 7 días de forma ininterrumpida.
- En un número limitado de pacientes, las ulceraciones bucofaringeas pueden ser signo de patologías graves. Por lo tanto los pacientes en los que los síntomas no desaparezcan en 3 días, deben consultar al médico o dentista.
- El uso prolongado puede dar lugar a fenómenos de sensibilización, así como, a irritación y sequedad de la mucosa bucal por contener etanol como excipiente.
- El uso de bencidamina no está recomendado en pacientes con hipersensibilidad al ácido salicílico y/o AINE.

**REACCIONES ADVERSAS**

- Ocasionalmente, excesiva [ANESTESIA LOCAL], sensación de escozor, [SEQUEDAD DE BOCA], [IRRITACION CUTANEA] e irritación local, en el lugar de aplicación.
- Excepcionalmente [ESPASMO LARINGEO] y [ANGIOEDEMA] de origen alérgico

**CONSERVACIÓN**

- No requiere condiciones especiales de conservación.

[Prospecto en PDF](#)

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.