

ULTRA LEVURA 250 MG 20 CAP



Calificación: Sin calificación

Precio

14,96 €

14,96 €

0,58 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ZAMBON](#)

Descripción

ACCIÓN Y MECANISMO

Antidiarreico. Microorganismo bacteriano. Actúa reemplazando la flora patógena del intestino por otra similar a la fisiológica.

INDICACIONES

-[DIARREA]. Tratamiento sintomático de las diarreas agudas inespecíficas y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos producidos por la administración de antibióticos.

POSOLÓGIA

* Tratamiento sintomático de las diarreas agudas inespecíficas y las producidas por la administración de antibióticos.

- Adultos y niños mayores de 12 años, oral: dosis máxima 500 mg/24 h; 1 cápsula de 250 mg/12-24 horas o bien 1 cápsula de 50 mg a lo largo del día (máximo 10 cápsulas).
- Niños entre 6-12 años, oral: dosis máxima 250 mg/24 h; 1 cápsula de 50 mg a lo largo del día hasta un máximo de 5 cápsulas.
- Niños hasta 6 años, oral: dosis máxima 150 mg/24 h; 1 cápsula de 50 mg/1-3 veces al día. * Prevención de los procesos diarreicos producidos la administración de antibióticos
- Adultos y adolescentes mayores de 12 años: dosis máxima 250 mg/24 h; 1 cápsula de 250 mg/24 h o bien 1 cápsula de 50 mg a lo largo del día en función de la evolución de los síntomas (máximo 5 cápsulas).

- Niños entre 6 y 12 años: dosis máxima 100 mg/24 h; 1 cápsula de 50 mg/12-24 h.
- Niños hasta 6 años: dosis máxima 50 mg/24 h.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Administrar preferiblemente antes de las comidas.
Las cápsulas se tragan enteras con un vaso de agua.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes
- Hipersensibilidad a las levaduras, especialmente *saccharomyces boulardii*.
- Pacientes con catéter venoso central

ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES:

- Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con [INTOLERANCIA A LACTOSA] hereditaria o galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malaabsorción de glucosa o galactosa, no deben tomar este medicamento.

PRECAUCIONES

- [MELENA]. Si la diarrea persiste más de 2 días o aparece sangre en las heces o fiebre, se debe evaluar al paciente reconsiderando el tratamiento y la necesidad de introducir rehidratación oral o parenteral.
- No se deben abrir las cápsulas en los alrededores de los pacientes con catéter venoso central, para evitar cualquier colonización, especialmente las transmitidas por las manos al catéter.

INTERACCIONES

- Tratamientos antifúngicos orales o sistémicos, debido a la naturaleza fúngica de la levadura *saccharomyces boulardii*. Evitar la administración conjunta.
- Bebidas o alimentos muy calientes (superior a 50°C), helados o que contengan alcohol ya que *saccharomyces boulardii* contiene células vivas. Evitar administrar *saccharomyces boulardii* con este tipo de bebidas o alimentos.

EMBARAZO

No hay datos en mujeres embarazadas. Por lo tanto, como precaución evaluar la relación beneficio/riesgo antes de tomar este medicamento durante el embarazo.

LACTANCIA

No hay datos relativos en mujeres en período de lactancia. Aunque *saccharomyces boulardii* no se absorbe, es preferible evaluar la relación beneficio/riesgo antes de utilizarlo durante la lactancia.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas se describen según cada intervalo de frecuencia, considerándose muy frecuentes (>10%), frecuentes (1-10%), poco frecuentes (0,1-1%), raras (0,01-0,1%), muy raras (<0,01%) o de frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

- Digestivas: Raras: [FLATULENCIA].
- Alérgicas/dermatológicas: Muy raras: reacción anafiláctica con [PRURITO], [URTICARIA], [ERUPCIONES EXANTEMATICAS], [ANGIOEDEMA].

[Prospecto en PDF](#)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.