

## VICKS VAPORUB 50 G



Calificación: Sin calificación

**Precio**

7,99 €

7,99 €

0,31 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante:[VICKS](#)

Descripción

**ACCIÓN Y MECANISMO**

- Combinación de sustancias aromáticas [EXPECTORANTE].

**INDICACIONES**

- [RESFRIADO COMUN]. Tratamiento de los síntomas de resfriado común y [GRIPE], tales como tos seca o congestión nasal.

**POSOLOGÍA**

DOSIFICACIÓN:

- Adultos y niños mayores de 3 años, tópica: Extender una fina capa en cuello, pecho y espalda de 1-3 veces/24 horas.
- Adultos y niños mayores de 6 años, inhalatoria: Añadir una cucharada de producto a un tazón con agua caliente, inhalando a continuación los vapores durante 10-15 minutos.

**CONTRAINDICACIONES**

- Hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento.
- [HERIDAS]. Este medicamento puede dar lugar a irritación dérmica, empeorando la situación del paciente en caso de [DERMATITIS], [ULCERA CUTANEA] o [QUEMADURAS].

**PRECAUCIONES**

- Historial de [ASMA] o [ESPASMO LARINGEO]. En estos pacientes podría producirse un espasmo de la musculatura lisa de laringe, tráquea y bronquios.
- [EPILEPSIA]. La administración de aceites esenciales se ha asociado con la aparición de cuadros convulsivos.

**CONSEJOS AL PACIENTE:**

- No debe emplearse este medicamento durante más de 7 días seguidos. Si pasado este tiempo, los síntomas continúan o empeoran, o si se acompañan de fiebre alta, erupciones cutáneas o cefalea persistente, se debe acudir al médico.
- No se debe aplicar este producto ni sobre el rostro ni sobre mucosas.
- Este producto no debe añadirse a vaporizadores fríos o humidificadores.

**EMBARAZO**

No se ha evaluado la seguridad y eficacia de este medicamento en mujeres embarazadas, por lo que no se recomienda su utilización.

**LACTANCIA**

Se desconoce si los principios activos de este medicamento se excretan en leche, y sus posibles efectos sobre el lactante, por lo que no se recomienda su utilización.

**NIÑOS**

No se dispone de experiencia con este medicamento en niños menores de tres años (vía tópica) o de seis años (vía inhalatoria) por lo que no se recomienda su uso.

**REACCIONES ADVERSAS**

- Alérgicas/dermatológicas. [REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD].

[Prospecto en PDF](#)

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.